

NutriniMax Multi Fibre og NutriniMax

Fullverdig sondeernæring med eller uten kostfiber (Multi Fibre-blanding) til barn fra 7-12 år eller 21-45 kg med normalt energibehov. Proteinsammensetning med et høyt innhold av myseprotein. Beriket med fiskeolje. Glutenfri. Klinisk laktosefri. Fiberfri i NutriniMax.

NutriniMax Multi Fibre og **NutriniMax** har en energitetthet på 1,0 kcal/ml.

NutriniMax Multi Fibre er en fullverdig standard sondeløsning tilsatt en blanding av 6 forskjellige kostfibrer (Multi Fibre-blanding) i en mengde tilpasset barn fra 7-12 år eller 21-45 kg. Multi Fibre-blanding reflekterer den fibersammensetning man får fra et sunt kosthold. Fiber er gunstig for tarmfunksjonen også for barn. **NutriniMax Multi Fibre** bør være første valg av sondeløsning for barn fra 7-12 år.

NutriniMax er en fullverdig standard sondeløsning for barn som trenger en fiberfri diett.

NutriniMax Multi Fibre og **NutriniMax** inneholder også en blanding av naturlige karotenoider som er viktige bestander i frukt og grønnsaker. Karotenoider styrker kroppens immunfunksjon. De positive effekter av karotenoider er mye av bakgrunnen for rådet om å spise 5 frukt og grønt om dagen.

Proteinsammensetning i **NutriniMax Multi Fibre** og **NutriniMax** består av 60% myseprotein og 40% kaseinprotein. Et høyt innhold av myseprotein gir raskere ventrikkeltømming, som kan forbedre toleranse.

NutriniMax Multi Fibre og **NutriniMax** er beriket med en blanding av langkjedete fett fra fiskeolje. Blandingen er særlig rik i innhold av dokosaheksaensyre (DHA), som er vist spesielt viktig for hjernens utvikling og funksjon. Mangel på DHA er en risikofaktor for sub-optimal neurologisk utvikling.

Bestillingsinformasjon

	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
NutriniMax Multi Fibre	839664	8 x 500 ml pack
NutriniMax	868272	8 x 500 ml pack



Næringsinnhold pr. 100 ml for NutriniMax Multi Fibre og NutriniMax:

	NUTRINIMAXI MF		NUTRINIMAX	NUTRINIMAX MF		NUTRINIMAX	
ENERGI	kcal	100	100	VITAMINER			
	kJ	420	420	A	µg RE	61	61
PROTEIN	g	3,3	3,3	Karotenoider	mg	0,15	0,15
nitrogen	g	0,5	0,5	D	µg	0,70	0,70
kasein	g	1,3	1,3	E	mg α-TE	1,3	1,3
myse	g	1,9	2,0	K	µg	4,5	4,5
soya	g	0,1		B ₁	mg	0,15	0,15
N:Non-protein energy		1:171	1:171	B ₂	mg	0,16	0,16
FETT	g	4,2	4,2	Niacin	mg-NE	1,5	1,5
mettet	g	0,5	0,5	Pantotensyre	mg	0,43	0,43
enumettet	g	2,4	2,4	B ₆	mg	0,15	0,15
flerumettet	g	1,3	1,3	Folsyre	µg	21	21
linolsyre	mg	936	937	B ₁₂	µg	0,24	0,24
α-linolensyre	mg	202	202	Biotin	µg	4,0	4,0
C 20:4, n-6 (AA)	mg	1,88	1,88	C	mg	10	10
C 20:5, n-3 (EPA)	mg	8,15	8,16	Kolin	mg	28	28
C 22:6, n-3 (DHA)	mg	33,9	33,9	Karnitin	mg	3,0	3,0
KARBOHYDRAT	g	12,3	12,3	Taurin	mg	10	10
sukkerarter	g	0,8	0,8	ENERGIFORDELING			
laktose	g	< 0,025	< 0,025	Protein	E%	13,0	13,0
polysakkarider	g	11,3	11,3	Fett	E%	38,0	38,0
stivelse	g	0,1		Karbohydrat	E%	49,0	49,0
andre	g	0,2	0,2	VANN	ml	84	85
KOSTFIBER	g	1,1	-	Osmolaritet	mOsmol/l	230	225
løselige	g	0,6		Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	275	270
uløselige	g	0,6		Potential Renal Solute Load	mOsmol/l	305	305
MINERALER				Viskositet	mPa.s	7	6
Natrium	mg (mmol)	80 (3,5)	80 (3,5)	Surhetsgrad	pH	6,8	6,8
Kalium	mg (mmol)	138 (3,5)	138 (3,5)				
Klor	mg (mmol)	110 (3,1)	110 (3,1)				
Kalsium	mg (mmol)	70 (1,7)	70 (1,7)				
Fosfor	mg (mmol)	60 (1,9)	60 (1,9)				
Magnesium	mg (mmol)	17 (0,7)	17 (0,7)				
Jern	mg	1,3	1,3				
Sink	mg	1,1	1,1				
Kopper	µg	108	108				
Mangan	mg	0,24	0,24				
Fluor	mg	0,09	0,09				
Molybden	µg	7,0	7,0				
Selen	µg	4,9	4,9				
Krom	µg	5,1	5,1				
Jod	µg	12	12				

Indikasjon: Sondeernæring til barn fra 7-12 år eller 21-45 kg med normalt energibehov. Multi Fibre-blandingen hjelper til med å normalisere tarmfunksjonen. **NutriniMax Multi Fibre** bør være første valg av sondeernæring til barn med normalt energibehov. **NutriniMax** brukes til de barn som trenger en fiberfri diett.

Dosering: Bestemmes av legen eller klinisk ernæringsfysiolog.

Kontraindikasjoner: **NutriniMax Multi Fibre** er kontraindisert hos barn som trenger en fiberfri diett. Spedbarn. Pasienter med galaktosemi. Intoleranse mot et eller flere av produktets ingredienser.

Forsiktighetsregler: Barn fra 1-6 år. Medisin skal ikke tilsettes sondeernæringen. De fleste medisiner har en pH som variere fra den hos sondeernæringen. Dette kan føre til koagulering av proteiner og forårsake at sondeløsningen blir bedrevet.

Administrasjon: Ch ≥ 6 kan gravitasjon eller enteral ernæringspumpe benyttes. Nutricia anbefaler at enteral ernæringspumpe benyttes ved administrasjon av sondeernæring til barn

Holdbarhet: 12 måneder fra produksjonsdato. Etter åpning – 24 timer. Holdbarhetsdato på pakningen.

Oppbevaring: Lagres tørt og mellom 5 – 25° C.