


PREOP

Klar, iso-osmolar karbohydratrikt næringstilskudd til preoperativ kostbehandling av elektive kirurgiske pasienter. Uten kullsyre. Kostfiberfri. Fettfri. Glutenfri. Laktosefri. Med sukker og søtstoff.

preOp gir optimal forberedelse før kirurgi. Studier viser at preOp reduserer preoperativ tørst og sult samt postoperativ insulinresistens og angst¹. preOp fører til raskere restituering og sykehusutskrivelse etter kirurgi¹.



| | | |
|-------------------|--------------|---------------------------|
| Protein: | ikke tilsatt | FODMAP pr. 100 ml: |
| Kostfiber: | ikke tilsatt | Laktose: <0,006 g |
| Halalsertifisert: | ja | Fruktose: 1,0 g |

BESTILLINGSINFORMASJON

| | Bestillingsnr. | Varenr. | Salgsenhet til apotek/sykehus |
|------------------|----------------|---------|-------------------------------|
| preOp sitronsmak | 571498 | 985901 | 4 x 200 ml flaske |

NÆRINGSINNHold PR. 100 ML PREOP:

| | | | | | |
|---|------|--------|------------------|--------------------------|-----------|
| Energi | KJ | 215 | Mineraler | | |
| | kcal | 50 | | Natrium | mg (mmol) |
| Fett (0 E%) | g | 0 | Kalium | mg (mmol) | 122 (3,1) |
| | | | Klorid | mg (mmol) | 6 (0,2) |
| Karbohydrat (100 E%) - hvorav sukkerarter - hvorav laktose | g | 12,6 | Kalsium | mg (mmol) | 6 (0,1) |
| | g | 2,1 | Fosfor | mg (mmol) | 1 (0,0) |
| | g | <0,006 | Magnesium | mg (mmol) | 1 (0,0) |
| Kostfiber (0 E%) | g | 0 | Vann | g | 92 |
| | | | Osmolaritet | mOsm/l | 240 |
| Protein (0 E%) | g | 0 | Osmolalitet | mOsm/kg H ₂ O | 260 |
| | | | pH | | 4,9 |
| Salt | g | 0,13 | | | |

Ingredienser:

Vann, maltodekstrin, fruktose, kaliumsitrat, natriumsitrat, surhetsregulerende middel (sitronsyre), aroma, søtstoff (acesulfam K, natriumsakkarin).

Inneholder per 100 ml

- 50 kcal
- 12,6 g karbohydrater (100 E%)

Smaksvarianter: Sitronsmak.

Indikasjon: Til preoperativ kostbehandling av elektive kirurgiske pasienter som skal ha generell anestesi.

Dosering: Startdose: 4 x 200 ml kvelden før kirurgi.
Sluttdose: 2 x 200 ml senest 2 timer før (pre-)anestesi.
Ved utsettelse av operasjon: Opp til 200 ml hver time inntil 2 timer før (pre-)anestesi.
Doseringen er individuell og skal gjøres i samråd med lege eller ernæringsfysiolog. Ikke egnet som eneste kilde til ernæring og skal brukes som tilskudd til det normale kostholdet.

Kontraindikasjoner: Akuttkirurgi og pasienter med forsinket ventrikkeltømming. Spedbarn. Intoleranse mot et eller flere av produktets ingredienser. Må ikke brukes parenteralt.

Forsiktighetsregler: Barn og pasienter med diabetes. Gravide pga. risiko for forsinket ventrikkeltømming.

Servering: Rist flasken før servering. Drikkes avkjølt eller romtemperert.

Holdbarhet: 15 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato på flasken. Åpnede flasker oppbevares i kjøleskap og anvendes innen 24 timer.

Oppbevaring: Lagres tørt og mellom 5–25°C.

Referanser: 1. Ljungqvist O, Scott M, Fearon KC. JAMA Surg. 2017 Mar 1;152(3):292-298.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

Nutricia Norge AS | Tlf. +47 23 00 21 00 | e-post nutricia@nutricia.no | web www.nutricia.no